MODE OPERATOIRE Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir	QGR-MO-327, v3 Date d'application : Date
Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance) Le :	Approbation : Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance) Le :	Vérification : Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)

Transfusion : Conduites à tenir en cas d'Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL)

1. **Arrêter la transfusion du PSL en cours + clamber la tubulure ET garder la voie veineuse.**
2. Contrôler et noter les paramètres vitaux (T° - TA - pouls - SaO2 - fréquence respiratoire).

SIGNES	TYPES D'EIR POSSIBLES	Pages ...
Frissons isolés	Réaction Fébrile Non Hémolytique (RFNH)	2 à 4
Fièvre isolée : si T° >38 ° avec augmentation d'au moins 1 ° C par rapport à la température avant transfusion	Réaction Fébrile Non Hémolytique (RFNH)	5 à 8
Frissons + fièvre : augmentation d'au moins 2 ° C par rapport à la température avant transfusion	Infection Bactérienne Transmise par Transfusion (IBTT)	9 à 12
Signes œdème pulmonaire : dyspnée, chute de la saturation, toux, expectorations mousseuses, râles crépitants, cyanose	Œdème pulmonaire de <u>surcharge</u> (TACO)	13 à 15
Syndrome de détresse respiratoire aiguë : dyspnée, chute de la saturation, chute TA, tachycardie, fièvre	Œdème pulmonaire <u>lésionnel</u> (TRALI)	13 à 15
Signes cutanés : urticaire, prurit, rash, rougeurs, œdème Et/ou plus rarement : signes cardiovasculaires, respiratoires, digestifs...	Allergie	16 à 18
Douleurs lombaires +++ Chute TA, tachycardie, angoisse	Incompatibilité immunologique	19 à 21

<p>Rhena CLINIQUE DE STRASBOURG</p>	MODE OPERATOIRE Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir	QGR-MO-327, v3 Date d'application : Date
Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance) Le :	Approbation : Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance) Le :	Vérification : Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)

Réaction Fébrile Non Hémolytique (SI FRISSONS ISOLES)

1. **Arrêter la transfusion du PSL en cours + clamper la tubulure ET garder la voie veineuse.**
2. **Contrôler et noter les paramètres vitaux (T° - TA - pouls - SaO2 - FR).**
3. **Contactez le médecin transfuseur pour la prise en charge du patient ou le médecin d'astreinte au 3939. En cas de doute sur une conduite à tenir, contactez l'EFS au 03 88 21 25 01.**
4. **Contactez un des deux médecins correspondants hémovigilance de la clinique => Dr Hamidi 3957 ou Dr Meyer 4504 (si pas dispo, doivent être avertis dans un délai de 8 heures).**
5. **Contrôler les concordances d'identité et le Dispositif de Contrôle Ultime Pré-transfusionnel (CUPT).**

Conseil : prélever le patient avec la même ailette pour les différents bilans.

6. Faire remplir au médecin un bilan immuno-hématologique (feuille bleue disponible dans le trieur TRANSFUSION) et cocher : RAI + Test de Coombs + Elution
7. Piquer un bilan avec 2 grands tubes violets EDTA.

LBM MULTISITE ALSACE ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Grand Est
85-87 BOULEVARD LDBAU - CS 18728 - 54064 NANCY CEDEX
Immunohématologie - Site de Strasbourg : Tél. 03 88 21 25 01 - Fax 03 88 21 25 42 - Site de Hautepierre : Tél. 03 88 12 71 78 - Fax 03 88 12 71 79
Site de Colmar : Tél. 03 89 30 12 61 - Fax 03 89 30 12 62 - Site de Mulhouse : Tél. 03 89 31 70 92 - Fax 03 89 31 70 98

DEMANDE D'EXAMENS BIOLOGIQUES : IMMUNO-HÉMATOLOGIE

IDENTIFICATION DU PATIENT
Remplir ou coller une étiquette sur chaque feuille

N° ENTRÉE	N° ordonnance
NOM D'USAGE
NOM DE FAMILLE	N O 5 3 7 5 3 4
PRÉNOM	DATE DE NAISSANCE
ADRESSE	SEXE ☐ F ☐ M
Établissement de soins	Unité fonctionnelle
AMBUULANT (informations complémentaires)	
Adresse CP et Commune	
Demande de tiers payant : joindre photocopie de la carte de Sécurité Sociale + feuille de soins signée par l'assuré(e) + ordonnance.	

Date et heure du prélèvement : / /

Préleveur : nom, qualité, signature et n° d'identification professionnel : _____ Signature collée : _____

Nom du prescripteur (obligatoire) : _____

EXAMENS BIOLOGIQUES PRESCRITS

☐ Groupage ABO-Rhésus-Kel	☐ Sang veineux	
☐ Recherche d'anticorps irréguliers (RAI)	☐ Titrage d'Ac Irregularité	☐ Dosage pondéral d'Ac Irregularité
☐ Épreuve de compatibilité si RAI positive (nombre d'unités prescrites)	☐ Recherche d'anti D résiduel (date de l'injection / / et dose / /)	☐ Dépistage et dosage de l'antigène immunitaire anti-A, anti-B
☐ Dépistage et dosage de l'antigène immunitaire anti-A, anti-B	☒ Test de Coombs direct (test direct à l'antiglobuline)	☒ Elution
☐ Auto ou Alloabsorption	☐ Bilan d'incident transfusionnel	

En cas de doute sur un examen, appeler le laboratoire.

Renseignements cliniques succincts Date prévue pour la transfusion : / /

- Antécédents transfusionnels :
- Grossesses (antérieures, en cours) :
- Injection d'immunoglobulines anti D le / / et dose :
- Anticorps Immuns : joindre résultats ABORIK + RAI matan

Urgence : cocher si []
Prélever l'antiglobuline et le sang de réserve
"Prélever en cas de doute"
Avec motif (obligatoire)

Pour plus d'informations médicales, visitez notre site www.efs.sainte-francescostrasbourg.net

<p>Rhena CLINIQUE DE STRASBOURG</p>	MODE OPERATOIRE Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir	QGR-MO-327, v3 Date d'application : Date
Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance) Le :	Approbation : Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance) Le :	Vérification : Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)

8. *Cas particulier* : en cas de transfusion de plaquettes, cocher la case : dépistage et titrage des anticorps immuns anti-A, anti-B. Piquer un grand tube EDTA violet en plus.

Si TRANSFUSION DE PLAQUETTES

EXAMENS BIOLOGIQUES PRESCRITS	
☐ Groupe ABO-Rhésus-Kell	☐ Sang veineux.....
	☐ Sang de cordon
☐ Détermination d'autres antigènes érythrocytaires (= phénotype étendu «).....	☐ Titrage d'Ac irrégulier(s)
☒ Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) ☐ Dosage pondéral d'Ac irrégulier(s)	
☐ Épreuve de compatibilité si RAI positive (nombre d'unités prescrites).....	
☐ Recherche d'anti D résiduel (date de l'injection / / et dose) et terme de la grossesse / /	
☒ Dépistage et titrage des anticorps immuns anti-A, anti-B	
☐ Dépistage et titrage d'agglutinines froides	
☒ Test de Coombs direct (test direct à l'antiglobuline) ☒ Éluion	
☐ Auto ou Alloabsorption	
☐ Bilan d'incident transfusionnel	

En cas de doute sur un examen, appeler le laboratoire.

9. *Autre cas particulier* : en cas de RAI positives pré transfusionnelles, cocher la case : épreuve de compatibilité. Piquer un grand tube EDTA violet en plus.

Si RAI POSITIVES

EXAMENS BIOLOGIQUES PRESCRITS	
☐ Groupage ABO-Rhésus-Kell	☐ Sang veineux.....
	☐ Sang de cordon
☐ Détermination d'autres antigènes érythrocytaires (= phénotype étendu «).....	☐ Titrage d'Ac irrégulier(s)
☒ Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) ☐ Dosage pondéral d'Ac irrégulier(s)	
☒ Épreuve de compatibilité si RAI positive (nombre d'unités prescrites).....	
☐ Recherche d'anti D résiduel (date de l'injection / / et dose) et terme de la grossesse / /	
☐ Dépistage et titrage des anticorps immuns anti-A, anti-B	
☐ Dépistage et titrage d'agglutinines froides	
☒ Test de Coombs direct (test direct à l'antiglobuline) ☒ Éluion	
☐ Auto ou Alloabsorption	
☐ Bilan d'incident transfusionnel	

En cas de doute sur un examen, appeler le laboratoire.

10. Selon avis du médecin, faire également un bilan de recherche Ac anti-HLA (feuille violette disponible dans le trieur TRANSFUSION). Piquer 2 tubes rouges.

EXAMENS BIOLOGIQUES PRESCRITS	
☐ Groupage ABO-Rhésus-Kell	☐ Sang veineux.....
	☐ Sang de cordon
☐ Détermination d'autres antigènes érythrocytaires (= phénotype étendu «).....	☐ Titrage d'Ac irrégulier(s)
☒ Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) ☐ Dosage pondéral d'Ac irrégulier(s)	
☒ Épreuve de compatibilité si RAI positive (nombre d'unités prescrites).....	
☐ Recherche d'anti D résiduel (date de l'injection / / et dose) et terme de la grossesse / /	
☐ Dépistage et titrage des anticorps immuns anti-A, anti-B	
☐ Dépistage et titrage d'agglutinines froides	
☒ Test de Coombs direct (test direct à l'antiglobuline) ☒ Éluion	
☐ Auto ou Alloabsorption	
☐ Bilan d'incident transfusionnel	

En cas de doute sur un examen, appeler le laboratoire.

11. Pour l'envoi des tubes à l'EFS (conservés à T° ambiante), contacter le transporteur au 7021.

<p>Rhena CLINIQUE DE STRASBOURG</p>	<p align="center">MODE OPERATOIRE</p> <p align="center">Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir</p>	<p>QGR-MO-327, v3</p> <p>Date d'application : Date</p>
<p>Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance)</p> <p>Le :</p>	<p>Approbation :</p> <p>Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance)</p> <p>Le :</p>	<p>Vérification :</p> <p>Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)</p>

7. Faire remplir au médecin un bilan immuno-hématologique (feuille bleue disponible dans le trieur TRANSFUSION) et cocher : RAI + Test de Coombs + Elution.

DEMANDE D'EXAMENS BIOLOGIQUES : IMMUNO-HÉMATOLOGIE

IDENTIFICATION DU PATIENT

N° ENTREE: _____ N° NIP: _____ N° ordonnance: _____

NOM D'USAGE: _____

NOM DE FAMILLE: _____

PRÉNOM: _____ DATE DE NAISSANCE: ____/____/____ SEXE: F M

PROFESSION: _____

Établissement de soins: _____

Unité fonctionnelle: _____

Adresse: _____ CP et Commune: _____

Date et heure de prélèvement: ____/____/____

Préleveur: nom, qualité, signature et n° d'identification professionnel: _____

Merci de prescrire: _____

EXAMENS BIOLOGIQUES PRÉSCRITS

Groupage ABO-Rhésus-Kell Sang veineux Sang de cordon Sang de cordon

Détermination d'autres antigènes érythrocytaires (= phénotype étendu)

Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) Titrage d'Ac irrégulier(s) Dosage pondéral d'Ac irrégulier(s)

Épreuve de compatibilité si RAI positive (nombre d'unités prescrites)

Recherche d'anti D résiduel (date de l'injection ____/____/____ et dose) et terme de la grossesse ____/____/____

Dépistage et titrage des anticorps immuns anti-A, anti-B

Dépistage et titrage d'agglutinines froides

Test de Coombs direct (test direct à l'antiglobuline) Éluion

Auto ou Alloabsorption

Bilan d'incident transfusionnel

En cas de doute sur un examen, appeler le laboratoire.

Renseignements cliniques succincts: _____ Date prélevé pour la transfusion: ____/____/____

• Antécédents transfusionnels

• Grossesses (généralistes, en cours)

• Injection d'immunoglobulines anti D le ____/____/____ et dose: _____

• Anticorps Immuns: genre résultats ABO/RH, + RAI marquer

8. Piquer un bilan avec 2 grands tubes violets EDTA.

9. *Cas particulier* : en cas de transfusion de plaquettes, cocher la case : dépistage et titrage des anticorps immuns anti-A, anti-B. Piquer un grand tube violet EDTA en plus.

Si TRANSFUSION DE PLAQUETTES

EXAMENS BIOLOGIQUES PRÉSCRITS

Groupage ABO-Rhésus-Kell Sang veineux

Détermination d'autres antigènes érythrocytaires (= phénotype étendu)

Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) Titrage d'Ac irrégulier(s) Dosage pondéral d'Ac irrégulier(s)

Épreuve de compatibilité si RAI positive (nombre d'unités prescrites)

Recherche d'anti D résiduel (date de l'injection ____/____/____ et dose) et terme de la grossesse ____/____/____

Dépistage et titrage des anticorps immuns anti-A, anti-B

Dépistage et titrage d'agglutinines froides

Test de Coombs direct (test direct à l'antiglobuline) Éluion

Auto ou Alloabsorption

Bilan d'incident transfusionnel

En cas de doute sur un examen, appeler le laboratoire.

10. *Autre cas particulier* : en cas de RAI positives pré transfusionnelles, cocher la case : épreuve de compatibilité. Piquer un grand tube violet EDTA en plus.

Si RAI POSITIVES

EXAMENS BIOLOGIQUES PRÉSCRITS

Groupage ABO-Rhésus-Kell Sang veineux

Détermination d'autres antigènes érythrocytaires (= phénotype étendu)

Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) Titrage d'Ac irrégulier(s) Dosage pondéral d'Ac irrégulier(s)

Épreuve de compatibilité si RAI positive (nombre d'unités prescrites)

Recherche d'anti D résiduel (date de l'injection ____/____/____ et dose) et terme de la grossesse ____/____/____

Dépistage et titrage des anticorps immuns anti-A, anti-B

Dépistage et titrage d'agglutinines froides

Test de Coombs direct (test direct à l'antiglobuline) Éluion

Auto ou Alloabsorption

Bilan d'incident transfusionnel

En cas de doute sur un examen, appeler le laboratoire.

<p>Rhena CLINIQUE DE STRASBOURG</p>	<p align="center">MODE OPERATOIRE</p> <p align="center">Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir</p>	<p>QGR-MO-327, v3</p> <p>Date d'application : Date</p>
<p>Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance)</p> <p>Le :</p>	<p>Approbation :</p> <p>Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance)</p> <p>Le :</p>	<p>Vérification :</p> <p>Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)</p>

11. Selon avis du médecin, faire également un bilan de recherche Ac anti-HLA (feuille violette disponible dans le trieur TRANSFUSION). Piquer 2 tubes rouges.

12. Pour l'envoi des tubes à l'EFS (conservés à T° ambiante), contacter le transporteur au 7021.

13. Prévenir l'EFS au 03 88 21 25 01 et lui adresser les poches (vides ou non, conservées à +4° au frigo) de tous les PSL transfusés dans les 8 heures qui ont précédé l'EIR après avoir fait **2 nœuds** (schéma ci-contre) dans leur emballage plastique.

MODE OPERATOIRE Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir	QGR-MO-327, v3 Date d'application : Date
Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance) Le :	Approbation : Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance) Le :	Vérification : Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)

INFECTION BACTERIENNE TRANSMISE PAR TRANSFUSION (IBTT)

1. **Arrêter la transfusion du PSL en cours + clamper la tubulure et faire 2 nœuds ET garder la voie veineuse selon le schéma ci-contre :**
2. **Contrôler et noter les paramètres vitaux (T° - TA - pouls - SaO2 - FR).**
3. **Contactez le médecin transfuseur pour la prise en charge du patient ou le médecin d'astreinte au 3939. Avertir l'EFS au 03 88 21 25 01.**
4. **Contactez un des deux médecins correspondants hémovigilance de la clinique => Dr Hamidi 3957 ou Dr Meyer 4504 (si pas dispo, doivent être avertis dans un délai de 8 heures).**
5. **Contrôler les concordances d'identité et le Dispositif de Contrôle Ultime Pré-transfusionnel (CUPT).**

Conseil : prélever le patient avec la même ailette pour les différents bilans.

6. **Chercher le kit IBTT dans le chariot d'urgence ou le tiroir transfusionnel.**

Composition du KIT IBTT :

- Sac plastique pour le(s) Produit(s) Sanguin(s) Labile(s) (PSL) incriminé(s)
- 1 bouchon rouge pour obturer l'extrémité de la tubulure du PSL
- 1 tube jaune + 3 grands tubes EDTA violets + 2 tubes rouges
- 4 flacons hémocultures (2 aérobies, 2 anaérobies)
- 1 aiguille à ailettes
- 1 tulipe

7. **Placer tous les PSL transfusés à +4°C au frigo dans un sac plastique et y coller une étiquette patient.**

<p>Rhena CLINIQUE DE STRASBOURG</p>	<p>MODE OPERATOIRE</p> <p>Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir</p>	<p>QGR-MO-327, v3</p> <p>Date d'application : Date</p>
<p>Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance)</p> <p>Le :</p>	<p>Approbation :</p> <p>Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance)</p> <p>Le :</p>	<p>Vérification :</p> <p>Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)</p>

8. **Piquer les hémocultures -> faire 2 prélèvements :**
- 1 flacon aérobie puis 1 anaérobie (les remplir entièrement jusqu'à 10 ml minimum et noter dessus numéro 1 et 2).
 - Et refaire 1 flacon aérobie puis 1 anaérobie (les remplir entièrement jusqu'à 10 ml minimum et noter dessus numéro 3 et 4).

Envoyer les flacons d'hémoculture au laboratoire de la clinique par pneumatique. (Ordonnance classique ou microbiologie et noter suspicion IBTT)

CLINIQUE RHENA
BON DE DEMANDE MICROBIOLOGIE

NOM : Prénom : Date :

Adresse : N° Hospit. : Heures de prélèvement :

Ne(e) le : CACHET ET SIGNATURE DU PRESCRIPTEUR : Lieu de prélèvement : Bloc Service
Préleveur :

Sexe : H F Service :
Chambre :

Recherche d'infection Bilan pré-opératoire Contrôle post-opératoire Si prélèvements pré-opératoires E7 OU sans milieu de transport -> acheminer en urgence au laboratoire (sachet magot) URGENT

Antibiothérapie en cours HNR OUI laquelle :

Neutropénie Allergie beta-lactamines Voyage ? oui non Pays visité :

Hospitalisation à l'étranger ? oui non

URINES
EBCU Mielier Pensex Urinocod Sonda à demeure/Gomme Ponction sus-pubienne Sondage AR Localisation :
 Prélèvement de signes cliniques Contrôle après antibiothérapie Absence de signes cliniques Sexe de grossesse Autre :

Aécis (3h) Sédiment seul Antigène Legionella PCR Chlamydiae/gonorrhoea (1^{er} jet) PCR Mycoplasmae urogénitales (1^{er} jet)

GENITAL OROSSEMBE oui non
Cervix-Vagina Urétral Marge anale Vagite Urétroréprogenital Autre :

Culture standard Shapto B : nb SA
Recherche par (CS) de : Chlamydiae/gonorrhoea Herpes (HSV 1 et 2) Mycoplasmae urogénitales Mycoplasmae urogénitales

NOUVEAU-NE
 Liquide gastrique Frottes d'oreille Frottes de gorge PCR Herpes : localisation :
 Autre :

POST-PARTUM
 Placenta : Face fœtal maternelle Lochies

RECHERCHE de BMR / S. aureus
 S. aureus frottes nez S. aureus (EIR) frottes rectal Entérocoques (BLE-EPO/frottes rectal) Cas osseux oui non / Cas contact oui non

RECHERCHE de BMR / S. aureus
 S. aureus frottes nez S. aureus (EIR) frottes rectal Entérocoques (BLE-EPO/frottes rectal) Cas osseux oui non / Cas contact oui non

HEMOCULTURES (micro-anaérobies)
 VVP VVC CIP Autre : Suspicion IBTT Recherche endocardite Flacon Mycoflex (recherche de levures)

PRELEVEMENT PROFOND (aéro-anaérobies)
Localisation :
 Abcès Post-opératoire Biopsie/Trauc Sinus Pus Barbitrite Fibrinaiol Plevion avec coelocscope / Douglas Autre :

LIQUIDE DE PONCTION
 LCR Ascite Pleural Endophtalmie DPCA (1 tube beige + flacon hématocrite) Articulaires (1 tube rouge + 1 tube vert hépatite) Autre :

PRELEVEMENT SUPERFICIEL
Localisation :
 Peau saine Ulcère Curatone Point position KT Dermohypodermite Liquide de : Frottes Drain Autre :
 KT CIP Sierist

MATERIEL
 KT CIP Sierist

SPHERE PULMONAIRE
 Crachats Aspiration trachéale LBA Lavage bronchique Autre :

Culture standard (Bactério/Myco) BK (Mycobactéries) : ED et culture PCR BK Pneumocystis jirovecii

Frottes ORL / OREILLES
 Gorge Langue Bouche Nez Oreil. Conduits auditifs externe Oreille moyenne (otomycose) Autre :

Culture standard (Bactério/Myco)

Sur frottes de gorge
 Mycoplasma pneumoniae (PCR)

Sur frottes nasopharyngées
 Recherche Grippe/VRS (PCR) Coqueluche (PCR)

SELLES
Aspect selles :
Nb selles / jour :
Voyage 5 jours : oui non Pays visité :

MYCOLOGIE (uniquement)
Localisation :
Aspect des selles :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES/AUTRES DEMANDES Suspicion IBTT

9. Faire remplir au médecin un bilan immuno-hématologique (feuille bleue disponible dans le trieur TRANSFUSION) et cocher : RAI + Test de Coombs + Elution + Bilan d'incident transfusionnel.

10. Piquer un bilan avec 2 grands tubes EDTA violets + 1 tube jaune.

EFSS LBM MULTISITE ALSACE ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Grand Est
85-87 BOULEVARD LOBAU - CS 10726 - 54864 NANCY CEDEX
Coordonnées : Site de Nancy - Tél. 03 83 31 11 41 - Fax 03 83 31 12 42 - Site de Mulhouse - Tél. 03 83 31 70 92 - Fax 03 83 31 70 91

DEMANDE D'EXAMENS BIOLOGIQUES : IMMUNO-HÉMATOLOGIE

IDENTIFICATION DU PATIENT
Remplir au cabinet des examens sur chaque feuille

N° ENTRE : NIP : N° ordonnance :

NOM D'USAGE :
NOM DE FAMILLE :
PRÉNOM : DATE DE NAISSANCE : SERIE : F M
MAGASIN :
Établissement de soins :
Unité fonctionnelle :
Adresse :
Demande de faire payer : photo photocopie de la carte de Sécurité Sociale + feuille de soins signalé par l'assuré(e) + ordonnance

Date et heure du prélèvement :
Préleveur : nom, qualité, signature et n° d'identification professionnel :
Nom du prescripteur (exonéré) :
Signature (obligatoire) :

EXAMENS BIOLOGIQUES PRESCRITS

Groupe ABO-Rhésus-Kat Sang venoux Sang de cordon

Détermination d'autres antigènes érythrocytaires (+ phénotype éritro-
 Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) Titrage d'Ac irréguliers Dosage pondéral d'Ac irréguliers

Épreuve de compatibilité si RV positive (nombre d'unités prescrites) Recherche d'anti-D hématu (date de l'injection : / / et dose : / / et terme de la grossesse : / /) Copiage et titrage des anticorps Immuns anti-A-anti-B Test de Coombs direct (pas direct à l'antiglobuline) Elution Auto ou Autoabsorption Bilan d'incident transfusionnel

En cas de doute sur un examen, appeler le laboratoire.

Renseignements cliniques succincts Date prévu pour la transfusion : / /

• Antécédents transfusionnels :
• Grossesses (antérieures, en cours) :
• Injection d'immunoglobulines anti-D le / / et dose :
• Anticorps Immuns : joindre résultats ABORH + RAI manuscrit

Urgence : oui non

Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site www.efss.sante.lorraine-grand-est.fr

<p>Rhena CLINIQUE DE STRASBOURG</p>	MODE OPERATOIRE Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir	QGR-MO-327, v3 Date d'application : Date
Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance) Le :	Approbation : Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance) Le :	Vérification : Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)

11. **Cas particulier : en cas de transfusion de plaquettes, cocher la case : dépistage et titrage des anticorps immuns anti-A, anti-B. Piquer un grand tube EDTA violet en plus.**

Si TRANSFUSION DE PLAQUETTES

EXAMENS BIOLOGIQUES PRESCRITS

Groupage ABO-Rhésus-Kell
 Détermination d'autres antigènes érythrocytaires (= phénotype étendu =)
 Recherche d'anticorps irréguliers (RAI)
 Recherche d'anti D résiduel (date de l'injection / / et dose) et terme de la grossesse / /
 Dépistage et titrage des anticorps immuns anti-A, anti-B
 Test de Coombs direct (test direct à l'antiglobuline)
 Bilan d'incident transfusionnel

En cas de doute sur un examen, appeler le laboratoire.

12. **Autre cas particulier : en cas de RAI positives pré transfusionnelles, cocher la case : épreuve de compatibilité.**

Si RAI POSITIVES

EXAMENS BIOLOGIQUES PRESCRITS

Recherche d'anticorps irréguliers (RAI)
 Épreuve de compatibilité si RAI positive (nombre d'unités prescrites)

En cas de doute sur un examen, appeler le laboratoire.

13. Selon avis du médecin, faire également un bilan de recherche Ac anti-HLA (feuille violette disponible dans le trieur TRANSFUSION). Piquer 2 tubes rouges.

14. Pour l'envoi des tubes à l'EFS (conservés à T° ambiante), **contacter le transporteur au 7021.**

EFSS

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - ALSACE - LORRAINE - CHAMPAGNE - ARDENNE
 85-87 BOULEVARD LOEBAU - CS 16728 - 54884 NANCY CEDEX
 Site de Strasbourg - Laboratoire HLA : ligne directe 03 83 31 33 97 - lignes extérieures +33 39 4022 78 4022
 Site de Nancy - Tél. 03 83 32 03 00 (jours 7/7) - Site de Clermont - Tél. 03 89 33 2 46 - Site de Metz - Tél. 03 89 31 91 91

DEMANDE D'ANALYSES BIOLOGIQUES - LABORATOIRE HLA ET IMMUNOLOGIE LEUCOPLAQUETTAIRE

IDENTIFICATION DU PATIENT

N° ENTRÉE : _____ N° AFF : _____ N° ORDONNANCE : _____
 NOM DE LA BUNNE FILLE : _____
 PRÉNOM : _____ DATE DE NAISSANCE : _____ SEXE : F M
 Établissement de soins : _____
 Adresse : _____ CP et Commune : _____
 Date de prélèvement : _____
 Nom et qualité du prescripteur : _____
 Nom du professeur : _____

ANALYSES BIOLOGIQUES PRESCRITES

Bilan dans le cadre HLA-méridien :
 HLA-A-B HLA-C HLA-DQB1 HLA-DPB1
 HLA-DPA1 HLA-DQA1 HLA-DQA2 HLA-DQA3 HLA-DQA4 HLA-DQA5 HLA-DQA6 HLA-DQA7 HLA-DQA8 HLA-DQA9 HLA-DQA10 HLA-DQA11 HLA-DQA12 HLA-DQA13 HLA-DQA14 HLA-DQA15 HLA-DQA16 HLA-DQA17 HLA-DQA18 HLA-DQA19 HLA-DQA20 HLA-DQA21 HLA-DQA22 HLA-DQA23 HLA-DQA24 HLA-DQA25 HLA-DQA26 HLA-DQA27 HLA-DQA28 HLA-DQA29 HLA-DQA30 HLA-DQA31 HLA-DQA32 HLA-DQA33 HLA-DQA34 HLA-DQA35 HLA-DQA36 HLA-DQA37 HLA-DQA38 HLA-DQA39 HLA-DQA40 HLA-DQA41 HLA-DQA42 HLA-DQA43 HLA-DQA44 HLA-DQA45 HLA-DQA46 HLA-DQA47 HLA-DQA48 HLA-DQA49 HLA-DQA50 HLA-DQA51 HLA-DQA52 HLA-DQA53 HLA-DQA54 HLA-DQA55 HLA-DQA56 HLA-DQA57 HLA-DQA58 HLA-DQA59 HLA-DQA60 HLA-DQA61 HLA-DQA62 HLA-DQA63 HLA-DQA64 HLA-DQA65 HLA-DQA66 HLA-DQA67 HLA-DQA68 HLA-DQA69 HLA-DQA70 HLA-DQA71 HLA-DQA72 HLA-DQA73 HLA-DQA74 HLA-DQA75 HLA-DQA76 HLA-DQA77 HLA-DQA78 HLA-DQA79 HLA-DQA80 HLA-DQA81 HLA-DQA82 HLA-DQA83 HLA-DQA84 HLA-DQA85 HLA-DQA86 HLA-DQA87 HLA-DQA88 HLA-DQA89 HLA-DQA90 HLA-DQA91 HLA-DQA92 HLA-DQA93 HLA-DQA94 HLA-DQA95 HLA-DQA96 HLA-DQA97 HLA-DQA98 HLA-DQA99 HLA-DQA100

MODE OPERATOIRE Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir	QGR-MO-327, v3 Date d'application : Date
Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance) Le :	Approbation : Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance) Le :	Vérification : Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)

Œdème pulmonaire de surcharge (TACO) ou Œdème pulmonaire lésionnel (TRALI)

1. **Arrêter la transfusion du PSL en cours + clamper la tubulure ET garder la voie veineuse.**
2. Mettre le patient en position assise ou demie assise + oxygénothérapie.
3. **Contrôler et noter les paramètres vitaux (T° - TA - pouls - SaO2 - FR).**
4. **Contacter le médecin transfuseur pour la prise en charge du patient ou le médecin d'astreinte au 3939. En cas de doute sur une conduite à tenir, contacter l'EFS au 03 88 21 25 01.**
5. **Contacter un des deux médecins correspondants hémovigilance de la clinique => Dr Hamidi 3957 ou Dr Meyer 4504 (si pas dispo, doivent être avertis dans un délai de 8 heures).**
6. **Contrôler les concordances d'identité et le Dispositif de Contrôle Ultime Pré-transfusionnel (CUPT).**
7. **Prise en charge éventuellement à prévoir :**
 - Auscultation (notion de râles crépitants) + ECG
 - Diurétiques / vasodilatateur
 - Gazométrie artérielle (envoyer au labo de la clinique)
 - Radio pulmonaire + échographie cardiaque

Si suspicion de TRALI :

8. **Chercher le KIT TRALI dans le chariot d'urgence ou le tiroir transfusionnel.**

Composition du KIT TRALI :

- Sac plastique pour le(s) Produit(s) Sanguin(s) Labile(s) (PSL) incriminé(s)
- 1 bouchon rouge pour obturer l'extrémité du PSL
- 3 grands tubes EDTA violets
- 2 tubes jaunes
- 2 tubes rouges
- 1 tulipe
- 1 ailette
- 1 seringue de gazométrie

MODE OPERATOIRE Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir	QGR-MO-327, v3 Date d'application : Date
Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance) Le :	Approbation : Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance) Le :	Vérification : Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)

Conseil : prélever le patient avec la même ailette pour les différents bilans.

- Faire remplir au médecin l'ordonnance QGR-DEX-035 disponible sur Ennov, prescription d'exploration des anticorps anti-granulocytes
- Piquer 2 tubes jaunes + 3 grands tubes EDTA violets + 2 tubes rouges (bien remplis).

DEMANDE D'EXAMENS
LABORATOIRE D'HEMOCOMPATIBILITE ET D'IMMUNOLOGIE LEUCO-PLAQUETTAIRE
1, rue Félix Eboué - 54000 Créteil
Tél : 01 36 73 76 51 (service de CPD/MLA compatible) - Fax : 01 36 73 76 52 (service de CPD/MLA compatible)
Site de Strasbourg : 14, 12 bis, 12 bis 02, 12 bis 03, 12 bis 04, 12 bis 05, 12 bis 06, 12 bis 07, 12 bis 08, 12 bis 09, 12 bis 10, 12 bis 11, 12 bis 12, 12 bis 13, 12 bis 14, 12 bis 15, 12 bis 16, 12 bis 17, 12 bis 18, 12 bis 19, 12 bis 20, 12 bis 21, 12 bis 22, 12 bis 23, 12 bis 24, 12 bis 25, 12 bis 26, 12 bis 27, 12 bis 28, 12 bis 29, 12 bis 30, 12 bis 31, 12 bis 32, 12 bis 33, 12 bis 34, 12 bis 35, 12 bis 36, 12 bis 37, 12 bis 38, 12 bis 39, 12 bis 40, 12 bis 41, 12 bis 42, 12 bis 43, 12 bis 44, 12 bis 45, 12 bis 46, 12 bis 47, 12 bis 48, 12 bis 49, 12 bis 50, 12 bis 51, 12 bis 52, 12 bis 53, 12 bis 54, 12 bis 55, 12 bis 56, 12 bis 57, 12 bis 58, 12 bis 59, 12 bis 60, 12 bis 61, 12 bis 62, 12 bis 63, 12 bis 64, 12 bis 65, 12 bis 66, 12 bis 67, 12 bis 68, 12 bis 69, 12 bis 70, 12 bis 71, 12 bis 72, 12 bis 73, 12 bis 74, 12 bis 75, 12 bis 76, 12 bis 77, 12 bis 78, 12 bis 79, 12 bis 80, 12 bis 81, 12 bis 82, 12 bis 83, 12 bis 84, 12 bis 85, 12 bis 86, 12 bis 87, 12 bis 88, 12 bis 89, 12 bis 90, 12 bis 91, 12 bis 92, 12 bis 93, 12 bis 94, 12 bis 95, 12 bis 96, 12 bis 97, 12 bis 98, 12 bis 99, 12 bis 100

DEMANDE D'ANALYSES BIOLOGIQUES : LABORATOIRE HLA ET IMMUNOLOGIE LEUCOPLAQUETTAIRE
IDENTIFICATION DU PATIENT
ANALYSES BIOLOGIQUES PRESCRITES
Bilan dans le cadre de la greffe d'organes
Bilan dans le cadre de la greffe de moelle osseuse
Bilan dans le cadre de l'immunologie pré-greffe
Bilan dans le cadre de la greffe transfusionnelle

11. Envoyer les 3 tubes EDTA + les 2 tubes jaunes + les 2 tubes rouges + l'ordo violette + 4 étiquettes patient + l'ordo QGR-DEX-035 à l'EFS de Strasbourg => appeler le transporteur au 7021.

Tous les tubes doivent être étiquetés avec l'identité du patient, l'heure et la date du prélèvement.
Tous les documents doivent comporter le nom de l'établissement, du service et du prescripteur.

<p>Rhena CLINIQUE DE STRASBOURG</p>	MODE OPERATOIRE Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir	QGR-MO-327, v3 Date d'application : Date
Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance) Le :	Approbation : Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance) Le :	Vérification : Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)

Allergie

1. **Arrêter la transfusion du PSL en cours + clamper la tubulure ET garder la voie veineuse.**
2. **Contrôler et noter les paramètres vitaux (T° - TA - pouls - SaO2 - FR).**
3. **Contactez le médecin transfuseur pour la prise en charge du patient ou le médecin d'astreinte au 3939. En cas de doute sur une conduite à tenir, contactez l'EFS au 03 88 21 25 01.**
4. **Contactez un des deux médecins correspondants hémovigilance de la clinique => Dr Hamidi 3957 ou Dr Meyer 4504 (si pas dispo, doivent être avertis dans un délai de 8 heures).**
5. **Contrôler les concordances d'identité et le Dispositif de Contrôle Ultime Pré-transfusionnel (CUPT).**
6. Chercher le KIT CHOC ANAPHYLACTIQUE dans le chariot d'urgence.
7. T1 : 10 à 30 min après les symptômes :

- Prélever 2 tubes : 1 grand tube EDTA violet (HISTAMINE et TRYPTASE) + 1 tube rouge IGE Spécifiques.

- Coller une étiquette patient sur chaque tube.
- Remplir les rubriques sur la feuille de renseignements du laboratoire.

- Mettre les 2 tubes et la fiche dans le sachet T1 et l'envoyer au laboratoire via le pneumatique.

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES	
Laboratoire CERBA	
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE :	
Nom du Laboratoire : _____	
N°Correspondant : _____	
Nom du Service : _____	
IDENTIFICATION DU PATIENT :	
Nom : _____	Age : _____
Prénoms : _____	Sexe : F / M
CHOC ANAPHYLACTIQUE :	
Date du choc : _____	Délai d'apparition : _____
Grade du choc (de 1 à 4) : _____	
☐ signes cutanés localisés ☐ réaction systémique modérée ☐ réaction mettant le vie en danger ☐ arrêt cardiaque ou respiratoire	
Circonstances d'apparition du choc :	
☐ exploration fonctionnelle (à préciser) : _____ ☐ anesthésie (indiquer le protocole) : _____ ☐ traitement (préciser la voie) : _____ ☐ autres : _____	
Réactions cliniques observées : _____	
Allergènes suspectés à tester : _____	Antécédents d'allergie : _____

MODE OPERATOIRE Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir	QGR-MO-327, v3 Date d'application : Date
Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance) Le :	Approbation : Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance) Le :	Vérification : Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)

8. T2 : entre 1h30 et 3h après les premiers symptômes :

- Prélever 1 grand tube EDTA violet (HISTAMINE et TRYPTASE)
- Coller une étiquette patient sur le tube.
- Remplir les rubriques sur la feuille de renseignements du laboratoire.
- Mettre le tube et la fiche dans le sachet T2 et l'envoyer au laboratoire via le pneumatique.

9. **Prévenir l'EFS au 03 88 21 25 01 et lui adresser les poches (vides ou non, conservées à +4° au frigo) de tous les PSL transfusés dans les 8 heures qui ont précédé l'EIR après avoir fait **2 nœuds** (schéma ci-contre) dans leur emballage plastique.**

<p>Rhena CLINIQUE DE STRASBOURG</p>	<p align="center">MODE OPERATOIRE</p> <p align="center">Transfusion : Effet Indésirable chez un Receveur (EIR) de Produit Sanguin Labile (PSL) : Conduites à tenir</p>	<p>QGR-MO-327, v3</p> <p>Date d'application : Date</p>
<p>Rédaction : Delphine BLANGENWITSCH (référente hémovigilance), Clio REININGER (référente hémovigilance)</p> <p>Le :</p>	<p>Approbation :</p> <p>Par : Sébastien BRESSOLIER (Directeur Général Adjoint), Armine HAMIDI (Médecin correspondant Hémovigilance)</p> <p>Le :</p>	<p>Vérification :</p> <p>Par : Caroline DEAU (Directrice Qualité et Affaires Réglementaires)</p>

Incompatibilité immunologique

- Arrêter la transfusion du PSL en cours + clamper la tubulure ET garder la voie veineuse.**
- Contrôler et noter les paramètres vitaux (T° - TA - pouls - SaO2 - FR).**
- Contacter le médecin transfuseur pour la prise en charge du patient ou le médecin d'astreinte au 3939. En cas de doute sur une conduite à tenir, contacter l'EFS au 03 88 21 25 01.**
- Contacter un des deux médecins correspondants hémovigilance de la clinique => Dr Hamidi 3957 ou Dr Meyer 4504 (si pas dispo, doivent être avertis dans un délai de 8 heures).**
- Contrôler les concordances d'identité et le Dispositif de Contrôle Ultime Pré-transfusionnel (CUPT).**

Conseil : prélever le patient avec la même ailette pour les différents bilans.

- Faire remplir au médecin un bilan immuno-hématologique (feuille bleue disponible dans le trieur TRANSFUSION) et cocher : RAI + Test de Coombs + Elution
- Piquer un bilan avec 2 grands tubes violets EDTA.

LBM MULTISITE ALSACE ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Grand Est
 85-87 BOULEVARD LOBAU - CS 10720 - 54564 NANCY CEDEX
Immunohématologie - Site de Strasbourg : Tél. 03 89 21 25 01 - Fax 03 89 21 25 62 - Site de Haguenau : Tél. 03 89 12 71 70 - Fax 03 89 12 71 70
 Site de Colmar : Tél. 03 89 30 12 67 - Fax 03 89 30 12 62 - Site de Mulhouse : Tél. 03 89 31 70 92 - Fax 03 89 31 70 81

DEMANDE D'EXAMENS BIOLOGIQUES : IMMUNO-HÉMATOLOGIE

IDENTIFICATION DU PATIENT
Remplir ou coller une étiquette sur chaque flacon

N° ENTRÉE : _____ N° ORDONNANCE : _____
 NOM D'USAGE : _____
 NOM DE FAMILLE : _____
 PRÉNOM : _____ DATE DE NAISSANCE : ____/____/____ SEXE : F M
 ADRESSE : _____ CP et Commune : _____
 Demande de frais payés : jointe photocopie de la carte de Sécurité Sociale + feuille de soins signée par l'assuré(e) + ordonnance

Date et heure de prélèvement : ____/____/____
 Prélèveur : nom, qualité, signature et n° d'identification professionnel : _____
 Nom du prescripteur (obligatoire) : _____ Signature obligatoire : _____

EXAMENS BIOLOGIQUES PRESCRITS

Groupe ABO-Rhésus-Kell Sang veineux _____ 1 tube EDTA 5 ml
 Détermination d'autres antigènes érythrocytaires (périodes érythrocytaires) _____ 1 tube EDTA 5 ml
 Recherche d'anticorps irréguliers (RAI) Titrage d'AC irréguliers Dosage pondéral d'AC irréguliers _____ 1 tube EDTA 5 ml
 Recherche de compatibilité en RAI positive (nombre d'unités prescrites) : _____ 1 tube EDTA 5 ml
 Recherche d'anti-D réactif (date de l'injection : ____/____/____ et dose : ____) et terme de la grossesse : ____/____/____ 1 tube EDTA 5 ml
 Dépistage et titrage des anticorps immuns anti-A, anti-B _____ 1 tube EDTA 5 ml
 Dépistage et titrage d'agglutinines froides _____ 2 tubes EDTA 5 ml
 Test de Coombs direct (test direct à l'antiglobuline) Elution _____ 1 tube EDTA 5 ml
 Auto ou Alloabsorption _____ 1 tube EDTA 5 ml
 Bilan d'incidence transfusionnel _____ 1 tube sec 7 ml
 En cas de doute sur un examen, appeler le laboratoire.

Renseignements cliniques succincts Date prévue pour la transfusion : ____/____/____

• Antécédents transfusionnels : _____
 • Grossesses (prétermes, en retard) : _____
 • Injection d'immunoglobulines anti-D le ____/____/____ et dose : _____
 • Anticorps immuns : joudre résultats ABORH, + RAI manuel

Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site www.efs.sante.fr/region/grand-est