

# Conseils pour la vaccination COVID en cas d'antécédent de manifestation allergique.

*Actualisation au 2 Juin 2021.*

Antécédent de manifestation allergique	conseil pour la vaccination	surveillance
<b>Allergie à un des composants du vaccin : exceptionnelle</b>	<b>contre-indication</b>	<b>pas de vaccination</b>
Allergie au polyéthylène-glycol (PEG)/macrogol* ou polysorbate 80*	COMIRNATY, MODERNA, VAXZEVRIA et JANSSEN: Contre-indication de principe et adresser en allergologie	
Allergie au trométamol ou trométhamine	MODERNA contre-indiqué	
Réaction immédiate ou retardée au décours de la 1ère injection de vaccin COVID 19	contre-indication au même vaccin et adresser en allergologie	vaccination après un avis expert
réaction locale après 1° injection de vaccin anti covid	vacciner autre bras en IM stricte	15 min et application topique cortisoné
Réaction d'allure allergique immédiate à un vaccin autre que COVID : exceptionnel	pas de contre-indication	
Toxidermie médicamenteuse immédiate ou retardée même grave: antibiotiques, curares ...	vaccination normale	15 minutes
Urticaire, angioedème, mastocytose	vaccination normale	15 minutes
Rhinite, conjonctivite, asthme (hors crise)	vaccination normale	15 minutes
Allergie au latex, venins d'hyménoptère, alimentaire, eczéma de contact	vaccination normale	15 minutes
Antécédents familiaux allergiques	vaccination normale	15 minutes

**\* uniquement en cas de produits injectables ou pour le macrogol en cas d'anaphylaxie après préparation colique**