



Le meilleur moyen de le savoir est de se faire dépister.

Trouvez le centre de dépistage le plus proche grâce à notre **carte interactive** :

www.corevih-grandest.fr

COREVIH GRAND EST



COREVIH-GRANDEST.FR

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
UF 2068
1, place de l'Hôpital BP426
67091 - STRASBOURG CEDEX

T. 03 88 11 53 68

M. secretariat.corevih@chru-strasbourg.fr

VIH, IST, HÉPATITES



C'est grave ?

COREVIH
GRAND EST

Le dépistage

est le moyen de détecter le VIH, les hépatites et les IST et d'accéder si besoin à des traitements efficaces.

QUAND ?

À n'importe quel âge et à chaque prise de risque, qu'elle soit récente ou de longue date.

OÙ ?

• Carte interactive sur : COREVIH-grandest.fr

• **CEGIDD** : Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic

- **CPEF** : Centre de Planification et d'Education Familiale
- **Associations** habilitées
- **Laboratoires de ville**

COMMENT ?

- Avec une **prise de sang**
- Un **TROD** – Test Rapide d'Orientation Diagnostique
- Un **Auto TEST VIH**
- Un **prélèvement local** pour certaines IST



Mon préservatif a glissé ou s'est déchiré pendant un rapport sexuel.



J'ai un doute sur le matériel utilisé pour mon piercing, tatouage, scarification.



J'ai eu un contact sanguin accidentel avec une autre personne.

Les situations à risque



J'ai eu un rapport sexuel sans préservatif.



J'ai partagé mon matériel lors d'un usage de drogue.

DANS CES SITUATIONS, LA CONTAMINATION N'EST PAS SYSTÉMATIQUE, MAIS IL SUFFIT D'AVOIR PRIS L'UN DE CES RISQUES POUR ÊTRE ÉVENTUELLEMENT CONTAMINÉ.

Les outils de prévention ont évolué. Le saviez-vous ?

TPE

Le Traitement Post Exposition est un traitement d'urgence qui associe plusieurs médicaments contre le VIH. Il permet de réduire les risques de contamination s'il est prescrit au plus près de la prise de risque (dans les 4h et au plus tard 48h).

TasP (TREATMENT as PREVENTION)

Une personne séropositive (vivant avec le VIH) qui prend correctement son traitement et dont la charge virale est dite « indétectable » depuis plus de 6 mois, ne peut plus transmettre le virus à son

partenaire. Le traitement devient un outil de Prévention.

LES PRÉSERVATIFS

(externes ou internes) permettent d'éviter de contracter le VIH, ainsi qu'un certain nombre d'autres IST. Les associations de prévention et les CeGIDD vous en mettent à disposition.

LA PreP

est un traitement antirétroviral délivré à titre préventif à des personnes séronégatives, qui du fait de leur pratiques sont à haut risque d'acquisition du VIH. Ce traitement préventif ne protège pas des IST.